Aleurocanthus spiniferus

Unionsquarantäneschädling

ALECSN

Insekt / Milbe

JKI, Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit in Kooperation mit den Pflanzenschutzdiensten der Bundesländer

Unternehmerpflicht

für die Ausstellung eines Pflanzenpasses

Gründliche visuelle Untersuchung von Wirtspflanzen zur Feststellung der Befallsfreiheit im Rahmen der Pflegemaßnahmen und Bestandeskontrollen sowie vor Ausstellung des Pflanzenpasses unter der Voraussetzung, dass die zuständige Behörde das Gebiet des Produktionsstandortes als frei von *Aleurocanthus spiniferus* befunden hat

Wirtspflanzen

besondere Anforderungen: **Citrus sp.**, *Fortunella sp.*, *Poncirus sp.*, *Cerantonia siliqua*, *Cercis siliquatrum*, *Clematis vitalba*, *Cotoneaster sp.*, *Crataegus sp.*, *Cydonia oblongata*, *Diospyros kaki*, *Eriobotrya japonica*, *Ficus carica*, *Hedera sp.*, *Magnolia sp.*, *Malus sp.*, *Melia sp.*, *Mespilus germanica*, *Myrtus communis*, *Parthenocissus sp.*, *Photinia sp.*, *Prunus sp.*, *Psidium guajava*, *Punica granatum*, *Pyracantha sp.*, *Pyrus sp.*, *Rosa sp.*, *Vitis sp.*, *Wisteria sp.*

Untersuchungszeitraum

Symptome

meist blattunterseits dichte Kolonien mit allen Stadien; Nymphen/Puparien: oval, schwarz mit weißem Wachsfadenkranz; Adulte: metallische graublau Mottenschildlaus ungewöhnlich deformierte Blätter; Honigtau und sekundäre Schwärzepilze erzeugen ein schmutziges Aussehen

Hinweise

- tropischer Schädling, der in einzelnen EU-Zitrusanbauregionen etabliert ist und von dort verschleppt werden kann
- Adult (1-1,7 mm); 4 Nymphenstadien, ggf. mehrere Generationen auch gleichzeitig
- Im Verdachtsfall/ bei Symptomen ist eine Probenahme und Untersuchung mit der zuständigen Behörde abzustimmen

Vorkommen

Frankreich, Griechenland, Italien, Albanien, Montenegro, Kroatien, südliches Afrika, Asien, Australien

Verbreitung

durch Pflanzen zum Anpflanzen, Pflanzenteile, Früchte; im Bestand natürliche Ausbreitung durch Flug

1 Adultes Weibchen

2 Eier und Nymphen

3 Puparien an Zitrus

4 Puparien an Wein

1 +2 = M.A. van den Berg, ITSC Nelspruit, South Africa durch EPPO (<https://gd.eppo.int>), 3 = Francesco Porcelli, Università di Bari durch EPPO (<https://gd.eppo.int>), 4 = Maja Pintar, Centre for Plant Protection, Croatian Agency for Agriculture and Food durch EPPO (<https://gd.eppo.int>)

Bearbeitung: H. Schmalstieg (BE), S. Rode (TH), M. Köhlinger (RP)

11/2024